

# Lokalanästhesie ohne Spritze



Ein gutes Gefühl –  
nichts zu fühlen

- Applikation in die Parodontaltasche
- Effektive Schmerzausschaltung<sup>1</sup>
- Keine Resttaubheit nach der Behandlung<sup>2</sup>



**oraqix**®  
PARODONTAL-GEL Lidocain  
Prilocain

**NEU:** Positive Bewertung von Oraqix durch 10 deutsche Universitäten: 65% der Patienten bevorzugen Oraqix gegenüber der herkömmlichen Injektion<sup>3</sup>.

For better dentistry

**DENTSPLY**

<sup>1</sup> Magnusson, I et al, J Periodontol May 2003: 74:597-602; Jeffcoat, M et al, J Periodontol July 2001: 72:895-900

<sup>2</sup> Moschos, I, et al, Dtsch Zahnärztl Z. May 2008: 63: 337-342

<sup>3</sup> Lowden, C.E. et al, J Dent Res 2008: 84: Special Issue, abstr. #1561

## Indikation und Anwendung

Oraqix<sup>®</sup> ist geeignet für die subgingivale Lokalanästhesie bei erwachsenen Patienten. Es ist eine lokale Schmerzkontrolle bei der Initial- oder Recallbehandlung von Zahnfleisch-erkrankungen, wie zum Beispiel Parodontitis.

## Produkteigenschaften

Oraqix<sup>®</sup> ist ein lokal subgingival aufzutragendes Anästhesie-Gel, das aus einer eutektischen Mischung von 2,5% Lidocain und 2,5% Prilocain in einem neuen thermoplastischen System besteht. Es wird flüssig aufgetragen und verändert sich in der Parodontaltasche zu einem Gel.

- Leichter Zugang durch eine stumpfe Kanüle, vergleichbar mit einer PA-Sonde
- Injektionsfrei
- Neue thermoplastische Zusammensetzung
- Wirkungseintritt in 30 Sekunden
- Wirkungsdauer ca. 20 Minuten
- Flexible Dosierbarkeit – zur Behandlung einzelner Parodontaltaschen, Quadranten oder Kiefer
- Wiederholbare Anwendung – Höchstdosis 5 Patronen (8,5 g Gel)
- Aufbewahrung bei Raumtemperatur

## Kontraindikationen

- Oraqix<sup>®</sup> ist kontraindiziert bei Patienten, die überempfindlich auf Lokalanästhetika vom Amid-Typ oder auf andere Komponenten des Produktes reagieren
- Oraqix<sup>®</sup> darf nicht injiziert werden!

## Unerwünschte Wirkungen

Die in klinischen Studien am häufigsten beobachteten unerwünschten Erscheinungen waren beschränkt auf lokale Reaktionen an den Parodontaltaschen, Geschmacksveränderungen und Kopfschmerzen.

# Gefühl nichts zu fühlen.

## Anleitung für maximalen Patientenkomfort



Bei schmerzempfindlichen Patienten Oraqix® mit einer stumpfen Kanüle am Gingivalrand auftragen und 30 Sekunden warten.



Vom Taschenboden beginnend bis zum Sulkusrand ausreichend mit Oraqix® auffüllen, bis das Gel sichtbar wird. Nicht direkt an der PA-Tasche absaugen. Nach 30 Sekunden kann die Behandlung gestartet werden.



Prüfung der Anästhesiewirkung durch Sondieren. Wirkungsdauer ca. 20 Minuten.

## Oraqix® Dispenser

- Der Oraqix® Dispenser ist bestimmt für das Auftragen des Oraqix®-Gel. Für andere Lokalanästhesieprodukte ist er nicht geeignet.
- Einfacher Zugang durch die stumpfe Kanüle, vergleichbar mit einer PA-Sonde. Die Oraqix® Kanüle kann zusätzlich gebogen und gedreht werden.
- Sterilisierbar
- Leichte Vorbereitung
- Praktische Dosiermechanik



## Was Sie wissen müssen:

- Schneller Wirkungseintritt, nach 30 Sekunden
- Ausreichende Wirkungsdauer, 20 Minuten
- Grosses Sicherheitsfenster, reapplizierbar (max. 5 Patronen/8,5 g Gel)
- Flexible Dosierbarkeit, einzelne PA-Taschen, Quadranten oder Kiefer
- Gleicher Behandlungserfolg (ermittelt über die Sondiertiefen und den Attachmentgewinn) wie bei herkömmlicher Anästhesie nachgewiesen\*
- Für Initial- und Recallbehandlungen

## Was Ihr Patient wissen sollte:

- Keine Angst, weil Applikation ohne Spritze
- Kein Injektionsschmerz, dadurch weniger Stress
- Kein Taubheitsgefühl und deshalb keine Alltagseinschränkungen nach der Behandlung



\* Termaat SHM et al., J Dent Res 2008, 84, Special Issue, abstr. # abstr. 2181

## Bestellinformation

### Oraqix Nachfüllpackung

20 Patronen á 1,7 g Gel,  
20 stumpfe Kanülen



Artikel-Nr.

**663.12.020 DE**

### Dispenser

- Sterilisierbar
- Leichte Vorbereitung
- Praktische Dosiermechanik



Artikel-Nr.

**66420**

Oraqix Parodontal-Gel. Zusammensetzung: Ein Gramm enthält 25 mg Lidocain und 25 mg Prilocain. Sonstige Bestandteile: Poloxamer 188, gereinigt; Poloxamer 407, gereinigt; Verdünnte Salzsäure zur pH-Einstellung. Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Oraqix ist bei Erwachsenen zur lokalen Anästhesie in Parodontaltaschen bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen wie Sondieren, Zahnsteinentfernung und/oder Wurzelglättung angezeigt. Gegenanzeigen: Oraqix ist bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Lidocain, Prilocain, anderen Lokalanästhetika vom Amid-Typ oder einem der sonstigen Bestandteile kontraindiziert, ebenso bei Patienten mit kongenitaler oder idiopathischer Methämoglobinämie oder rezidivierender Porphyrie. Warnhinweise: Oraqix darf nicht injiziert werden. Nebenwirkungen: Es konnten keine Nebenwirkungen spezifisch auf Oraqix zurückgeführt werden. Die in allen klinischen Studien am häufigsten aufgetretenen unerwünschten Ereignisse bestanden in lokalen Reaktionen in der Mundhöhle. Häufigkeit und Art der Begleiterscheinungen waren bei Oraqix bzw. Placebo vergleichbar. Methämoglobinämie: Prilocain kann erhöhte Methämoglobin-Spiegel induzieren, die zu einer Zyanose führen können. Im Rahmen der klinischen Studien mit Oraqix wurde nicht über Methämoglobinämie berichtet. In seltenen Fällen wurden Lokalanästhetika mit allergischen Reaktionen (in den schwersten Fällen mit einem anaphylaktischen Schock) in Verbindung gebracht. Während der klinischen Studien mit Oraqix wurde nicht über allergische Reaktionen berichtet. Art und Inhalt des Behältnisses: Glaspatrone mit 1,7 g Gel. Pharmazeutischer Unternehmer: DENTSPLY DeTrey GmbH, 78467 Konstanz, Deutschland. Stand der Information: Dezember 2004. Apothekenpflichtig.

Vertrieb durch:

### DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1  
78467 Konstanz  
GERMANY  
www.dentsply.de  
DENTSPLY Service-Line für Deutschland:  
08 000-735 000 (gebührenfrei)

For better dentistry

# DENTSPLY